



Α' ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΠΘ
ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ

15-16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2008
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ
ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ PALACE ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ Δ.Ε.Β.Ε.

(11 CME/CPD ΜΟΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ Π.Ι.Σ.)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ



ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ

Byetta[®]
 ένεση εξενατιδής

Το **BYETTA** επαναφέρει σε λειτουργία τα β-κύτταρα για αυτορυθμιζόμενο γλυκαιμικό έλεγχο του Διαβήτη Τύπου 2



Με το **BYETTA** επιτυγχάνεται:

- Σταθερή μείωση της HbA1c
- Σταθερή μείωση του σωματικού βάρους



Το **Byetta** χορηγείται με προγεμισμένη πένα σε απλή και σταθερή δόση πριν το πρωινό και το βραδινό γεύμα ή τα δύο κύρια γεύματα της ημέρας (μεσολάβηση τουλάχιστον 6 ωρών).



Όνομασία: BYETTA, 5 μικρογραμμάρια, ενέσιμο διάλυμα, προγεμισμένη πένα και BYETTA, 10 μικρογραμμάρια, ενέσιμο διάλυμα, προγεμισμένη πένα. **Θεραπευτικές ενδείξεις:** Το BYETTA ενδείκνυται για τη θεραπεία του σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2 σε συνδυασμό με μετροφορμίνη ή/και σουλφονυλουρίες σε ασθενείς στους οποίους δεν έχει επιτευχθεί ικανοποιητικός γλυκαιμικός έλεγχος με τη μέγιστη ανεκτή δόση με τις παραπάνω από του στόματος αγωγές. **Δοσολογία και τρόπος χορήγησης:** Η θεραπεία με το BYETTA πρέπει να αρχίζει με δόση των 5 μg εξενατιδής δις ημερησίως (BID) επί ένα μήνα τουλάχιστον, έτσι ώστε το φάρμακο να είναι καλύτερα ανεκτό. Προκειμένου να βελτιωθεί ο γλυκαιμικός έλεγχος περαιτέρω, η δόση της εξενατιδής μπορεί στη συνέχεια να αυξηθεί στα 10 μg δις ημερησίως (BID). Δόσεις άνω των 10μg δις ημερησίως δεν συνιστώνται. Το BYETTA μπορεί να χορηγηθεί οποιαδήποτε στιγμή εντός του χρονικού διαστήματος των 60 λεπτών πριν από το πρωινό και πριν το βραδινό γεύμα (ή πριν τα δύο κύρια γεύματα της ημέρας, μεταξύ των οποίων πρέπει να μεσολάβουν 6 ή περισσότερες ώρες). Το BYETTA δεν πρέπει να χορηγείται μετά το γεύμα. **Αντενδείξεις:** Υπερευαίσθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα. **Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση:** Το BYETTA δεν πρέπει να χορηγείται σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 ή για τη θεραπεία της διαβητικής κетоξέωσης. Το BYETTA δε πρέπει να χορηγείται σε τύπου 2 διαβητικούς ασθενείς που έχουν ανάγκη νοσηλοθεραπείας λόγω ανεπάρκειας των β-κυττάρων. **Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά σκευάσματα :** Η δράση του BYETTA που είναι η επιβράδυνση της γαστρικής κίνησης ενδέχεται να επιφέρει μείωση του βαθμού και του ρυθμού απορρόφησης των από του στόματος χορηγούμενων φαρμακευτικών προϊόντων. **Ανεπιθύμητες ενέργειες:** Η πιο συχνά αναφερόμενη ανεπιθύμητη ενέργεια ήταν η ναυτία. Τα περισσότερα επεισόδια ναυτίας ήταν ήπιες έως μέτριες έντασης και είχαν δοσοεξαρτημένο χαρακτήρα. Με τη συνέχιση της θεραπείας, η συχνότητα και η ένταση μειώθηκε στους περισσότερους ασθενείς που αρχικά εμφάνισαν ναυτία. **Μειότερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος:** Φυλάσσετε σε ψύξη (2 °C - 8 °C). Μην καταψύχετε. Κατά τη χρήση φυλάσσετε σε θερμοκρασία μικρότερη των 25 °C. **Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας:** Eli Lilly Nederland B.V., Groenloolde 1-5, NL-3991 RA Houten, Ολλανδία. **Αριθμός άδειας κυκλοφορίας:** EU/1/05/362/001-2. **παραρτηριακή πράξη έγκρισης:** 20 Νοεμβρίου 2006. **Τιμές:** Byetta 5μg 142,44 €, Byetta 10μg 142,44 €. Χορηγείται με ιατρική συνταγή.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Η Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, συνεχίζοντας την παράδοση των τελευταίων ετών, οργανώνει εκπαιδευτική διημερίδα που απευθύνεται σε νεαρούς ιατρούς Παθολόγους, Γενικής Ιατρικής καθώς και ειδικευόμενους που ενδιαφέρονται για περαιτέρω επιστημονική ενημέρωση. Οι ομιλητές της διημερίδας είναι όλοι ειδικοί στον τομέα που θα αναπτύξουν και κατά κανόνα είναι στελέχη της οργανώτριας κλινικής ή συνεργαζόμενοι καθηγητές στο εκπαιδευτικό μας έργο.

Τα θέματα που θα αναπτυχθούν επιλέχθηκαν με κριτήριο τη συχνότητα αντιμετώπισής τους στην κλινική πράξη και τις εξελίξεις που επιβάλλουν επιστημονική ενημέρωση. Εξάλλου, ένας καλός κλινικός ιατρός οφείλει να ενημερώνεται και να διαβάσει κάθε μέρα, δεδομένου ότι η ιατρική γνώση, στις μέρες μας, αυξάνεται με μεγάλη ταχύτητα και πρέπει να καταβάλλεται από τους ιατρούς ιδιαίτερη προσπάθεια για την παρακολούθηση των εξελίξεων. Σε αυτόν τον τομέα πιστεύω ότι συμβάλλουν και οι ημερίδες που οργανώνει η κλινική μας.

Στη διάρκεια της διημερίδας θα χρειαστεί μερικές φορές να συμπληρώσετε ερωτηματολόγια για αξιολόγηση των διδασκόντων και ελέγχου της κατανόησης των μαθημάτων. Το τελευταίο επιβάλλεται λόγω της χορηγήσεως εκπαιδευτικών μορίων από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

Η Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, μια από τις παλιότερες κλινικές της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ, σας προσκαλεί να συμμετάσχετε με ενθουσιασμό στη διημερίδα.

Ο υπεύθυνος οργάνωσης της διημερίδας

Δημήτριος Θ. Καραμήτσος

Καθηγητής Ιατρικής σχολής ΑΠΘ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2008

09:00 – 09:30 ΕΓΓΡΑΦΕΣ

09:30 – 10:00 ΕΝΑΡΞΗ – ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ

10:00 – 11:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Πρόεδρος: **Α. Παπαδόπουλος**

Διαγνωστική προσέγγιση αναιμιών
Α. Παπαδόπουλος

Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση θρομβοφιλίας
Φ. Γκιρτοβίτης

Εξελίξεις στη θεραπεία αιματολογικών κακοηθειών
Γ. Καϊάφα

11:30 – 12:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

12:00 – 13:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Πρόεδρος: **Μ. Σιών**

Αιφνίδιος καρδιακός θάνατος
Ι. Χ. Στυλιάδης

Αντιμετώπιση στεφανιαίας νόσου σε διαβητικό ασθενή
Σ. Γαβριηλίδης

Διάγνωση και θεραπεία ενδοκαρδίτιδας
Γ. Γιαννόγλου

13:30 – 14:00 ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

14:00 – 15:00 ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ

15:00 – 17:15

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Πρόεδρος: **Δ. Καραμήτσος**

Φαρμακευτική θεραπεία ΣΔ τύπου 2

Φ. Ηλιάδης

Αρχές ινσουλινοθεραπείας

Δ. Καραμήτσος

Διάγνωση διαβητικής νευροπάθειας

Τ. Διδάγγελος

17:15 – 17:45

ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2008

10:00 – 11:30

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Πρόεδρος: **Δ. Κολιούσκας**

Θεραπεία ηπατίτιδας Β και C

Ο. Γιουλεμέ

Νόσος γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης

Θ. Μάρης

Μη αλκοολική λιπώδης νόσος ήπατος

Δ. Καραμήτσος

11:30 – 12:00

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

12:00 – 14:00

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Πρόεδρος: **Α. Χατζητόλιος**

Αρχές αντιβιοτικής θεραπείας

Σ. Μεταλλίδης

Θεραπεία ουρολοιμώξεων

Δ. Αγαπάκης

Θεραπεία πνευμονίας

Φ. Ηλιάδης

Θεραπεία λοιμώξεων χοληφόρων

Μ. Μασμανίδου

14:00 – 15:00

ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ

15:00 – 16:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Πρόεδρος: **Δ. Γρέκας**

Θεραπεία ιδιοπαθούς υπέρτασης

Β. Άθυρος

Αντιμετώπιση υπερτασικού διαβητικού ασθενούς

Α. Χατζητόλιος

Διάγνωση και θεραπεία δευτεροπαθούς υπέρτασης

Χ. Σαββόπουλος

16:30 – 17:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

17:00 – 18:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Πρόεδρος: **Δ. Καραμήτσος**

Διαγνωστική προσπέλαση αρθρίτιδας

Τ. Σφέτσιος

Επείγουσες καταστάσεις στα ρευματικά νοσήματα

Ι. Στεργίου

Θεραπεία με μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα

Α. Αδαμίδου

Θεραπεία με κορτικοστεροειδή

Μ. Αλεβίζος

19:00 – 19:30 ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

19:30 ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΙ

Δ. Αγαπάκης / Επικουρικός ιατρός ΕΣΥ, Α' Προπ. Παθολ. Κλινική, Νοσοκ. ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη

Α. Αδαμίδου / Λέκτορας Παθολογίας ΑΠΘ, Α' Προπ. Παθολ. Κλινική, Νοσοκ. ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη

Β. Άθυρος / Επίκ. Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ, Β' Προπ. Παθολ. Κλινική, Νοσοκ. Ιπποκράτειο, Θεσσαλονίκη

Μ. Αλεβίζος / Τέως Αναπλ. Καθηγητής Παθολογίας-Διαβητολογίας ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη

Σ. Γαβρηλίδης / Καθηγητής Καρδιολογίας ΑΠΘ, Α' Καρδιολογική Κλινική, Νοσοκ. ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη

Γ. Γιαννόγλου / Καθηγητής Καρδιολογίας ΑΠΘ, Α' Καρδιολογική Κλινική, Νοσοκ. ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη

Ο. Γιουλεμέ / Λέκτορας Γαστρεντερολογίας ΑΠΘ, Α' Προπ. Παθολ. Κλινική, Νοσοκ. ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη

Φ. Γκιρτοβίτης / Επιστ. Συνεργάτης Α' Προπ. Παθολ. Κλινικής, Νοσοκ. ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη

Δ. Γρέκας / Καθηγητής Νεφρολογίας ΑΠΘ, Α' Παθολογική Κλινική, Νοσοκ. ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη

Τ. Διδάγγελος / Λέκτορας ΑΠΘ, Α' Προπ. Παθολ. Κλινική, Νοσοκ. ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη

Φ. Ηλιάδης / Λέκτορας Παθολογίας-Διαβητολογίας ΑΠΘ, Α' Προπ. Παθολ. Κλινικής, Νοσοκ. ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη

Γ. Καϊάφα / Λέκτορας Αιματολογίας, Α' Προπ. Παθολ. Κλινική, Νοσοκ. ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη

Δ. Καραμήτσος / Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ, Διευθυντής Α΄ Προπ. Παθολ. Κλινικής, Νοσοκ. ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη

Δ. Κολιούσκας / Αναπλ. Καθηγητής ΑΠΘ, Α΄ Προπ. Παθολ. Κλινική, Νοσοκ. ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη

Θ. Μάρης / Γαστρεντερολόγος, Δρ ΑΠΘ, Επιμελητής ΕΣΥ, Θεσσαλονίκη

Μ. Μασμανίδου / Επιστ. Συνεργάτης Α΄ Προπ. Παθολ. Κλινικής, Νοσοκ. ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη

Σ. Μεταλλίδης / Επιστ. Συνεργάτης Α΄ Παθολογικής Κλινικής, Νοσοκ. ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη

Α. Παπαδόπουλος / Αναπλ. Καθηγητής ΑΠΘ, Νοσοκ. ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη

Χ. Σαββόπουλος / Επίκ. Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ, Α΄ Παθολογική Κλινική, Νοσοκ. ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη

Μ. Σιών / Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ, Διευθυντής Γ΄ Παθολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη

Ι. Στεργίου / Επιστ. Συνεργάτης Α΄ Προπ. Παθολ. Κλινικής, Νοσοκ. ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη

Ι. Χ. Στυλιάδης / Καθηγητής Καρδιολογίας ΑΠΘ, Α΄ Καρδιολογική Κλινική, Νοσοκ. ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη

Τ. Σφέτσιος / Ρευματολόγος, Επιστ. Συνεργάτης Α΄ Παθολογικής Κλινικής, Νοσοκ. ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη

Α. Χατζητόλιος / Αναπλ. Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ, Α΄ Προπ. Παθολ. Κλινική, Νοσοκ. ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Παρασκευή 15 – Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2008

ΤΟΠΟΣ: Αίθουσες ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ι και ΙΙ, Ξενοδοχείο Makedonia Palace, Θεσσαλονίκη

ΕΓΓΡΑΦΕΣ: Η εγγραφή στην εκπαιδευτική διημερίδα παθολογίας είναι δωρεάν.

Για τη συμμετοχή σας στη διημερίδα, μπορείτε να συμπληρώσετε τη Φόρμα Εγγραφής σε Συνέδριο, στο www.medevents.gr

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ:

Τα πιστοποιητικά θα παραλαμβάνονται με τη λήξη της διημερίδας από τη γραμματεία και μοριοδοτούνται με 11 CME/CPD credits από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο

ΕΚΘΕΣΗ:

Κατά τη διάρκεια της διημερίδας θα λειτουργεί έκθεση φαρμακευτικών προϊόντων για την ενημέρωση των συμμετεχόντων.

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ:

Η αίθουσα της διημερίδας είναι εξοπλισμένη με data video projector και ηλεκτρονικό υπολογιστή με PowerPoint.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

INVENTICS A.E.

9ο χλμ Θεσσαλονίκης - Θέρμης

ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ - Κτίριο THERMI II

Τ.Θ. 60714, 570 01 Θέρμη Θεσσαλονίκης

Τηλ.: 2310 474 400, 801 454-5

Fax: 2310 801 454

info@inventics.net ● www.inventics.net

Olartan

Olmesartan + HCTZ
20/12,5mg
20/25mg

Plus[®]



MENARINI HELLAS A.E.

ΑΝ. ΔΑΜΒΕΡΓΗ 7, 10445 ΑΘΗΝΑ, ΘΛΑ.: 210/8316.111-13, FAX: 210/8317.343, E-MAIL: menarini@otenet.gr